Vaccinarea și epidemia de rujeolă

În perioada 2017-2019 România s-a confruntat cu peste 17.530 de cazuri de rujeolă raportate și 64 de decese.



Cauza

Scăderea acoperirii vaccinale la nivel național cu ROR, vaccinul care previne rujeola. Acoperirea se referă la copii până în 5 ani vaccinați cu cele două doze recomandare de ROR. De la 96% în 2007 până la doar 75% în 2017.



La nivel regional, există câteva județe care au reușit să mențină acoperirea vaccinală ridicată. Satu Mare, Bistrița și Giurgiu au avut o acoperire de peste 80% între 2016 și 2019.

Acoperirea cu a doua doză ROR la 5 ani în perioada 2016 –2019



Concluzii

Performanța constantă a celor trei județe a putut fi obținută doar prin organizare și implicarea activă a medicilor de familie care lucrează în aceste zone. Acești oameni au reușit să-i protejeze pe copiii din județele lor de boli care lasă cicatrici adânci și, uneori, se pot dovedi fatale.



SURSE

- https://cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale/929-analiza-rezultatelor-estimarii-acoperirii-vaccinale-cu-2-doze-rro-la-varsta-de-5-ani-si-cu-dt-la-varsta-de-14-ani-februarie-2018/file
- https://cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale/1200-analiza-rezultatelor-estimarii-acoperirii-vaccinale-cu-dt-si-cu-2-doze-rro-1/file
- https://cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale/677-analiza-rezultatelor-estimarii-acoperirii-vaccinale-cu-dt-si-cu-2-doze-rro-februarie-2017/file
- https://cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/evaluarea-acoperirii-vaccinale/592-analiza-rezultatelor-estimarii-acoperirii-vaccinale-cu-dt-si-cu-2-doze-rro/file